

成  
方  
切  
用

吳氏醫學述第四種成方切用目錄

卷十上

經帶門

正方二十一  
附方七

溫經湯

膠艾湯

方見胎產門

柏子仁丸

升陽舉經

湯

東垣升陽  
舉經湯

固經丸

通瘀煎

連附四物湯

四物

加芩木湯  
寒六合湯

四物加芩連湯  
氣六合湯

熱六合湯  
風六合湯

正氣天

香散

調經飲

毓麟珠

啟宮丸

抑氣散

五物煎

牡丹皮散

芩歸六君子湯

逍遙飲

如聖散

人參荊芥散

固下丸

白芷散

當歸煎丸

婦寶丹

見理血門

吳氏醫學述第四種

武原吳儀洛遵程輯

門人周蘭九生庭同較  
殷豫龍浩如

成方切用

經帶門

婦人諸病本與男子無異而其有異者則唯經帶胎產之屬不得不另詳

方論此外雜證但與男子相同者自有各門方治故不以男女分而資噴于此。凡行經之際大忌寒涼諸藥飲食亦然。

溫經湯

金匱

治婦人少腹寒久不受胎兼治崩中

去血或月水來過多及至期不來

金匱曰婦人年五十所病

下利數十日不止。暮即發熱。少腹裏急。腹滿。手  
掌煩熱。唇口乾燥。何也。曰。此病屬帶下。何以故。  
曾經半產。瘀血在少腹不去。何以知之。其唇口  
乾燥。故知之。當以溫經湯主之。徐忠可註曰。此  
段言歷年血寒積結胞門。而甚焉者也。故就婦  
人之年暮。經水斷絕者。而亦必據證斷之。以立  
法也。謂婦人年五十。其天癸已絕。應不從經血  
起見矣。然而病證下利數十日不止。知非偶感  
矣。暮即發熱。病屬陰矣。少腹裏急。明乎病屬下  
焦矣。因而腹滿。是雖脾病。而根于下焦矣。手掌  
煩熱。掌屬心。心主血。血鬱則煩熱也。唇口必得  
脾家營氣而津潤。營氣鬱。則陰火從之。故乾燥  
非渴也。渴則為胸中熱。胸無熱。而但陰分有鬱  
火。故不渴。而乾燥也。然皆非相因的對之證。故  
疑而問。仲景乃略其下利發熱。腹滿。而斷之為  
帶下。且決其曾經半產。瘀血在少腹不去。謂下  
利而發熱。陰虛者有之。因。而少腹裏急。下多。亾  
陰者有之。腹滿。脾虛者有之。手掌煩熱。陰虛者

有之。若唇口乃營氣所主。下利之病。不應見此。然而有是證。又合之少腹裏急。手掌煩熱。明是血瘀而火鬱。所以心得之而掌熱。脾得之而唇口燥。故曰其證唇口乾燥。故知之。藥用溫經湯者。因半產之虛。而積冷氣結。血乃瘀而不去。故以歸芍芩調血。吳茱萸桂枝以溫其血分之氣。而行其瘀。肺為氣主。麥冬阿膠以補其本。土以統血。參甘以補其虛。丹皮以去標熱。然下利已久。脾氣有傷。故以薑半正脾氣。名曰溫經湯。治其本也。唯溫經。故凡血分虛寒而不調者。皆主之。

吳茱萸

兩三當歸

芩薊

芍藥

人參

桂枝

阿膠

丹皮

生薑

甘草

麥冬

去半夏

升一

右十二味

以水一斗

煮取三升

分溫三服

膠艾湯

金匱

治婦人

陷經漏下

黑不解

或損傷衝

任月水過多淋瀝不斷

方見下卷胎產門

婦人之經雖從下出實由心胃之氣主之故升降有期今日漏下是無期也所漏者黑是下有因寒而滯之物故曰陷經陷者有降無升久則爲黑色故以膠艾湯主之四物通調肝血加甘膠峻補之病本于寒故以艾溫而行之也謂丹溪人之經淡爲有水紫爲熱黑爲熱極故兼水化假令其人素從熱病來者容有之然而仲景之言道其常也

栢子仁丸

方良

治經行復止血少神衰

女子善懷

憂多則傷心心傷則不能生血而血少血少則肝無所藏而衝任之脈枯故經閉不行也。經曰月事不來者胞脈閉也胞脈者屬心而絡于胞中今氣上逼肺心氣不得下降故月事不來

栢子仁

去油

牛膝

浸酒

卷栢

錢五

澤蘭續斷二熟地

黃一兩

蜜丸米飲下

栢子仁安神而養心地黃續斷牛膝補肝腎而

益衝任卷栢澤蘭活血脈而通經閉。

升陽舉經湯

東垣

治崩漏身熱自汗短氣倦怠懶

食

此由勞傷所致。

補中益氣湯見氣門加白芍黑山梔薑棗煎

補中湯以益氣升陽退熱收汗加芍藥以斂陰

黑梔以清熱

又東垣蘭室秘藏升陽舉經湯黃耆當歸白朮

各三錢羌活防風藁本各二錢獨活附子炮甘草各

半錢人參熟地川芎各一錢細辛六分桃仁十箇去紅

花肉桂芍藥各五分每服三錢漸加至五錢治經水

不止原文曰如右尺脈按之空虛是氣血俱脫

皆陽脫之證陰火亦山見熱證于口鼻眼或渴此皆陰躁陽欲先入也當溫之舉之升之燥定

富大升浮氣血切  
補命門之下脫也

固經丸

治經行不止及崩中漏下紫黑成塊

衝任為經脈之海。若無損傷則陰陽和平。氣血調適矣。若勞動過度損傷臟腑。衝任之氣虛不能約制經血。故經多暴下。或由陰虛陽搏為熱所乘。攻傷衝任。血得熱則妄行也。脈數疾小為順。大者為逆。紫黑成塊者熱甚而反兼水化。非寒也。王機微義曰。血得寒則凝。既行而紫黑。故知非寒也。

龜板

炙四兩

芍藥

酒炒

黃檗

酒炒三兩

黃芩

二兩

香附

童便浸炒

樗皮

兩半

酒丸

經多不止者。陰氣不足以制胞絡之火。故越其

常度也崩中漏下者虛而挾熱也紫黑成塊者  
火極似水也黃芩清上焦之火黃檗瀉下焦之  
火龜板芍藥滋陰而養血皆壯水以制陽光也  
香附辛以散鬱樗皮瀉以止脫

通瘀煎

治婦人氣滯血積經脈不利痛極拒按

及產後瘀血實痛并男婦血逆血結等證

歸尾

錢三五

山查

香附

紅花

新者炒黃二錢

木香七分

烏藥

錢一二

青皮

澤瀉

錢五分

水煎加酒一二

小鍾

兼寒滯者加肉桂一錢或吳茱萸五分

火盛內熱血燥不行者加炒梔子一二錢

微熱血虛者加芍藥二錢 血虛滯加牛膝

血瘀不行者加桃仁二十粒去皮尖或加蘇木

延胡之類 瘀極而大便結燥者加大黃一二

三錢或朴硝蓬朮亦可

連附四物湯丹溪治經水過期紫黑成塊紫血熱也黑熱

甚也過期而成塊氣滯也或風冷乘之也若淡白者虛也或挾痰停水以混之也如煙塵豆汁

屋漏水混濁模糊者淫痰也

四物湯門血加香附黃連四物以益陰養血加黃連以清血熱香附以行

氣變

四物加芩朮湯

亦名溫六合丸

治經水過多

黃芩抑陽白朮補脾

脾能統血

四物加芩連湯

治經水適斷

五心煩熱

經

來色黑或如豆汁

如豆汁者熱兼溼也芩連苦燥溼而寒勝熱

四物

加梔連為熱六合湯加薑附名寒六合湯加陳

朴名氣六合湯加羌芩為風六合湯皆經產通

用之藥也

調經飲

治經脈阻滯氣逆不調多痛而實者

當歸

錢三五

牛膝

山查

錢二

香附

青皮

茯苓

一錢五分

如因不忌生冷而寒滯于內加肉桂吳

茱萸之類如脹悶者加厚朴一錢或砂仁亦

可氣滯者加烏藥一錢或痛在小腹者加小

茴香一錢五分

正氣天香散

紺珠

治一切諸氣氣上湊心心胸攻

築脇肋刺痛月水不調

婦人多憂鬱故氣病為多氣為血帥氣滯則血

亦不能行故月候不調

香附

錢八

烏藥

錢二

陳皮

蘇葉

錢一

乾薑

分五

每五

六錢煎

烏藥陳皮專入氣分而理氣香附紫蘇能入血分而行氣引以乾薑使入氣分兼入血分用諸辛溫以解鬱散肝令氣調而血和則經行有常自無痛壅之患矣

毓麟珠 治婦人血氣俱虛經脈不調或斷續或

帶濁或腹痛或腰痠或飲食不甘瘦弱不孕服

一二觔即可受胎凡種子諸方無以加此

甘草 川芎雨一熟地蒸菟絲子製當歸雨四杜仲

炒酒人參 白朮炒土茯苓 芍藥炒酒鹿角霜 川

椒二兩

爲末蜜丸彈子大空心嚼服一二丸用

酒或白湯送下或爲小丸吞服亦可如經遲

腹痛宜加破故紙

酒炒

肉桂各一兩甚者再加吳

茱萸五錢或加龍骨一兩

醋煨

如子宮寒甚或

泄或痛加製附子或炮薑

酒炒

有鬱怒氣不順

而爲脹爲滯者宜加香附

酒炒

二兩或甚者再加

沉香五錢

血熱多火經蚤內熱者加川斷地

骨皮各二兩或另以湯劑暫清其火而後服此

或以湯引送下亦可男子製服宜加枸杞胡

桃肉鹿角膠山藥山茱萸巴戟肉各二兩

啟宮丸

治子宮脂滿不能孕育

婦人肥盛不孕往往因此

芩薊

白朮

半夏麴

香附

一兩

茯苓

神麴

五錢橘紅

甘草

二錢

粥丸

橘半白朮燥溼以除其痰

肥而不孕多由痰盛故以二陳為君而加

氣血藥也

香附神麴理氣以消其滯川芎散鬱以活

其血則壅者通塞者啟矣茯苓甘草用以去溼

和中也

抑氣散

藏氏

治婦人氣盛于血變生諸證頭暈

滿凡入血氣和平則無諸疾。苟血少氣多壅于胸膈則滿上攻于頭則運。

香附四兩陳皮二兩甘草炙茯神一兩每服二錢。

經曰高者抑之香附能散鬱氣陳皮能調諸氣

茯神能安心氣甘草能緩逆氣氣得其平則無

亢害之患矣氣盛于血固當抑氣若通用行氣之藥則真氣耗散陰火愈盛而氣

血兩虛矣是方雖和平祇可暫用須用滋血之藥使陰血充足則陽火自平乃正治之法蓋補

其不足即所以制其有餘也。

五物煎 治婦人血虛凝滯蓄積不行小腹急痛

產難經滯等證此即四物湯加肉桂也

當歸三五錢熟地三四錢白芍二錢川芎一錢肉桂二錢

三錢如兼胃寒或嘔惡者加乾薑水道不利

者加澤瀉或茯苓氣滯者加香附或丁香木

香砂仁烏藥陰虛疝痛者加小茴香血瘀

不行臍下若覆杯漸成積塊者加桃仁或酒炒

紅花

牡丹皮散良方

治血瘕瘀血凝聚而成伏于隱僻之處盤結膠固須破血活

血之品治之

丹皮桂心歸尾延胡索三牛膝赤芍

藥

莢蒨

分六三稜分四

水酒各半煎

丹皮桂心赤芍牛膝以行其血三稜莢蒨歸尾  
延胡以行其血中氣滯氣中血滯氣血週流則  
結者散矣

芩歸六君子湯

治經水後期其來濇少形體肥

盛

體肥而經水後期濇少者  
氣虛而痰滯于經絡也

當歸

川芎

人參

白朮

茯苓

甘草

橘紅

半夏

加薑煎

二陳治其痰滯

參朮補其氣虛

氣行則痰行

芩歸活

其經血

逍遙飲

治婦人思鬱過度致傷心脾衝任之源

血氣日枯漸至經脈不調者

當歸

錢二三

熟地

錢三五

棗仁

錢二

芍藥

茯神

錢一五

甘草

錢一

陳皮

分八

遠志

分三五

如氣虛者加人

參一二錢

經水過期兼痛滯者加酒炒香附

一二錢

如聖散

治崩漏不止

凡非時血行淋漓瀝不已謂之漏下忽然暴下如山崩

然謂之崩中有五色以應五藏。

櫻櫚

燒

烏梅

一兩

黑薑

兩半

每服二錢

烏梅湯下

瀉能止血故用櫻櫚酸能收斂故用烏梅溫能

守中故用乾薑黑能止血故並煨用

人參荆芥散

婦寶

治血風勞

血風勞者血脈空疎

感受風邪寒熱盜汗

展轉不已乃成勞也

人參

白朮

熟地

棗仁

炒

鱉甲

童便

羚羊

角

枳殼

柴胡

荆芥

五分

防風

甘草

炙

芎

翦

當歸

桂心

三分

加薑煎

陳來章曰血中之風荆芥防風散之木盛生風

羚羊柴胡平之陰虛發熱地黃鱉甲滋之血氣  
痛滯月水不調芩薊當歸桂心枳殼調之倦怠  
食少盜汗心忪人參白朮炙草棗仁補而收之

固下丸

和子

治赤白帶下

帶下起于胞中或中經脈

流入藏腑陰虛陽竭營氣不升衛氣下陷滯于下焦奇經之氣因帶脈而得者故曰帶赤者屬血白者屬氣其狀如涕相連而下言帶者亦病形也  
有驚恐而木乘土位濁液下流者或思無窮而為白淫者或餘經淫熱屈滯于小腹之下者病本雖殊皆為氣血虛損營衛果滯而成也

檮皮

兩半

白芍

錢五

良薑

煨黑

黃檗

煨黑

三錢

粥丸米飲

下

陳來章曰。檮皮苦燥溼寒勝熱。潛固下。故赤白

帶因于溼熱者。用之為君。古方有蒼藥檮皮。側

九隨證加香薷歸芍芍藥之酸。斂陰氣。收下溼

為臣。良薑之熱。以散寒溼。黃藥之寒。以祛熱溼

並炒黑以止血。收脫為佐使也。

白芷散。良方治赤白帶滑脫不禁。良方曰。帶下由

傷。傷肝經者。色青如泥。傷心經者。色赤如津。傷

肺經者。色白如涕。傷脾經者。黃如爛瓜。傷腎經

者。黑如血。者。黑如白芷散。當歸煎丸七

白芷

煨一兩

海螵蛸

煨二兩

胎髮

五錢

酒調

二錢

白芷辛溫燥溼而祛風。烏鰂鹹溫收溼而和血。

髮者血之餘。補陰消瘀。煨黑又能止血也。

當歸煎丸

氏嚴

治赤白帶下。腹中痛。不飲食。羸瘦。

此血虛有熱之證。法當涼補。脈訣云。崩中日久。為白帶。漏下多時。骨本枯。言崩久則血少。復亡其陽。故自滑之物。下泄不止。

當歸

熟地

阿膠

炒

續斷

白芍

炒

牡蠣

二地榆

炒黑三錢

醋糊丸米飲下

歸芍熟地續斷阿膠補肝滋腎。以治血虛。牡蠣

地榆清熱收脫以止帶下。赤芍酸寒能散惡血去瘀所以生新散之亦以收之也。

吳氏醫學述第四種成方切用目錄

卷十下

胎產門 正方正方三十七  
附方二十一

膠艾湯

又方  
膠艾湯

又

當歸芍藥散

桂枝茯苓丸

乾薑人參半夏丸

橘皮湯

半夏茯苓湯

鈎

藤湯

當歸貝母苦參丸

羚羊角散

天仙藤

散

紫蘇飲

白朮散

鯉魚湯

竹葉湯

紫

苑湯

安榮散

胎元飲

固胎煎

涼胎飲

參朮飲

表實六合湯

表虛六合湯

升麻六合湯

風溼六合湯  
柴胡

六合湯 大黃六合湯 人參六合湯 朴實六合湯

合湯 梔子六合湯 石膏六合湯 茯苓六合湯

湯 膠艾四物湯 附子 當歸散 達生散 束胎丸

六合湯 四物大黃湯 當歸補血湯 加葱白方

枳殼 散 殿胞煎 豬蹄湯

散 參朮膏 黑神散 九蜜煎 清化飲 失笑散

通靈 清魂散 當歸羊肉湯 當歸生薑 返魂丹

散 免懷湯 艾附煖宮丸 見理 佛手散 見理 歸芳湯

見理 血門 血門

血門

吳氏醫學述第四種

武原吳儀洛遵程輯

門人

周蘭九生庭  
殷豫龍浩如  
同較

成方切用

胎產門

王節齋曰。調理妊婦。在于清熱養血。胎聖藥。清熱故也。朱丹溪曰。產後當大補氣血。雖有雜證。從末治之。此二說雖若近理。而實未可奉為定訓也。蓋人之氣秉。萬有不齊。而胎前產後之虛實寒熱。人人各殊。是以用藥之難。常如盤珠。不可膠柱而鼓瑟。今女科每執方以槩治諸病。其為害不知若干人矣。

膠艾湯

金

仲景云。婦人有漏下者。有半產後因

續下血都不絕者有妊娠忽下血者假令妊娠

腹中痛為胞阻膠艾湯主之此槩言婦人下血宜以膠艾湯溫補

其血而妊娠亦其一。但致病有無端漏下者此平日血虛而加客邪。牛產後續下血不絕

此因失血血虛而正氣難復若妊娠下血因瘀者固有之而兼腹中痛則是因胞阻阻者阻其

欲行之血而氣不相順非癥瘕害也故同以膠艾湯主之養陰補血莫如四物血安行必挾風

而為痰濁膠以驤皮為主能去風以濟水煎成能澄濁艾性溫而善行能導血歸經甘草以和

之使四物不偏于陰三味之力也而運用之巧實在膠艾

乾地黄六兩艾葉三兩當歸三兩芍藥四兩阿膠二兩

甘草二兩水五升清酒三升合煮取二升去

渣內膠令消盡溫服一升日三服不差更作一

方加乾薑二兩

胡氏治胎動無乾薑

嚴氏治胎動經漏腰

痛腹滿搶心短氣加黃耆千金翼治從高墜下

損傷五臟吐血及金瘡經肉絕者加乾薑

又方阿膠一觔蛤粉炒艾葉數莖亦名膠艾湯

良方治胎動不安腰腹疼痛或胎上搶心去血腹

痛指迷方加秦艽

當歸芍藥散

金匱

治婦人懷妊腹中疝痛

疝音絳又音絞

急痛也

芍藥

一觔澤瀉

半觔茯苓

白朮

四兩當歸

芩藳

三兩

六味杵爲散取方寸匕酒和日三服

疴痛者正氣不足使陰得乘陽而水氣勝土脾鬱不伸鬱而求伸土氣不調則急痛矣故以歸芍養血苓朮扶脾澤瀉瀉其有餘之舊水芩藳暢其欲遂之血氣不用黃芩疴痛因虛則稍挾寒也然不用熱藥原非大寒正氣充則微寒自去爾

桂枝茯苓丸

金匱云婦人宿有癥病經斷未及

三月而得漏下不止胎動在臍上者此爲癥瘕  
害妊娠六月動者前三月經水利時胎動也下  
血者後斷三月衄也所以血不止者其癥不去  
故也當下其癥桂枝茯苓丸主之徐忠可曰婦人  
行經時遇冷則餘血留而爲癥癥者謂有形爲徵然癥病  
女人恒有之或不在子宮則仍行經而受孕經  
斷卽是孕矣未及三月將三月也既孕而仍見  
血謂之漏下今未三月而漏下不止則養胎之  
血傷故胎動也假使胎在臍下則真欲落矣今  
在臍上是每月湊集之新血因癥氣相妨而爲  
漏下實非胎病故曰癥瘕害宿疾難愈曰瘕無  
端而累之日害至六月胎動此宜動之時矣但  
較前三月經水利時胎動下血則已斷血三月  
不行乃復血不止是前之漏下新血去而癥反

堅牢不去故須下之爲安耳

桂枝 茯苓 牡丹皮 桃仁去皮尖熬芍藥 等

分末之煉蜜丸如兔屎大每日食前服一丸不知加至三九

桂枝芍藥一陽一陰茯苓丹皮一氣一血調其寒溫扶其正氣桃仁以之破惡血消癰癖而不嫌于傷胎血者所謂有病則病當之也且癥之初必因寒桂能化氣而消本寒癥之成必挾溼熱爲窠囊苓滲溼氣丹清血熱芍藥斂肝血而

扶脾使能統血則養正卽所以去邪耳然消癥  
方甚多一舉而兩得莫有若此方之巧矣每服  
甚少而頻更巧要知癥不礙胎其結原微故以  
漸磨之

乾薑人參半夏丸

金匱

治妊娠嘔吐不止

乾薑

人參

兩一

半夏

兩二

末之以生薑汁糊爲

丸如梧子大每服十九日三服

諸嘔吐酸皆屬于火此言胃氣不清暫作嘔吐  
者也若妊娠嘔吐不止則因寒而吐上出爲嘔

不止則虛矣故以半夏治嘔人參補虛而以生

薑汁協半夏以下其所逆之飲

橘皮湯 治妊娠嘔吐不下食惡阻以聞食而嘔

食入復吐責之有火所謂諸逆衝上屬于火也乃厥陰之血既養其胎少陽之火虛而上逆也

橘皮 竹筴 人參 白木十八 生薑兩 厚朴

銖十二

竹筴能平少火厚朴能下逆氣橘皮生薑所以

開胃人參白朮所以益脾開胃益脾欲其安穀

云爾

半夏茯苓湯

治孕娠惡阻

惡阻者惡心而妨阻飲食也此是下部氣

血不足復盜脾胃之氣以固養胎元故令脾胃自弱一聞穀氣便惡心而妨阻也

半夏

生薑

銖三十

乾地黄

銖十八

旋覆花

白芍

藥

人參

芎藭

細辛

橘皮

甘草

桔

梗

銖十二

半夏生薑能開胃而醒脾地黄芎藭能養陰而

益血人參甘草能和中而益氣橘皮桔梗旋覆

細辛皆辛甘調氣之品可以平惡逆之氣而進

飲食者也

半夏為妊婦所忌以其燥陰液也若惡阻之證則有當用者故孫真人養

胎之劑用半夏者蓋五方焉

鈎藤湯良方

治瘧瘵胎動不安

瘧瘵手足抽掣也熱為陽風主動肝

風相火為病也

鈎藤鈎

當歸

茯神

人參

錢二桔梗

半錢

桑寄

生五分

風熱加黃芩梔子柴胡白朮風痰加半

夏南星竹瀝風勝加全蠍僵蠶

鈎藤之甘寒以除心熱而散肝風柴胡桔梗之

辛涼黃芩梔子之苦寒以平少陽厥陰之風熱

風熱去則瘧瘵止矣人參茯神以益氣而寧神

當歸寄生以養血而安胎也

當歸貝母苦參丸

金匱

治妊娠小便難飲食如故

當歸

貝母

苦參

等分煉蜜丸如小荳大

飲服三丸加至十丸

從來小便難傷寒熱邪傳裏則有之必先見表證或化源鬱熱者有之上必見渴中氣不化者有之飲食必不調中氣下陷者有之必先見脾胃證下焦鬱熱有之必不渴而飲食如故今妊娠飲食如故然小便難必因便溺時得風冷鬱

於下焦而為熱致耗膀胱之水故以苦參能入  
陰治大風開結氣除伏熱為君當歸辛溫能入  
陰利氣善治衝帶之病為臣其證雖不由肺然  
膀胱者氣化之門下竅難則上必不利故以貝  
母開肺氣之鬱為佐全不用利水藥病不因水  
鬱也

羚羊角散

本事方

治妊娠中風涎潮忽仆目弔口

噤角弓反張名子癇

陰主靜陽主動風陽邪也諸風眩掉皆屬肝木故有

搖搖眩胃反張之證

羚羊角屑一錢 獨活 防風 芩藹 當歸 棗

仁炒 茯神 杏仁 薏仁五分 木香 甘草二分

加薑煎一方有五加皮

羚羊角之辛涼以平肝火防風獨活之辛溫以

散風邪茯神酸棗以寧神當歸川芎以活血杏

仁木香以利氣薏仁甘草以調脾也扶土所以抑木故薏

仁亦治筋急拘攣之證

紫蘇飲氏嚴 治胎氣不和湊上胸腹腹滿頭痛心

腹腰脇痛名子懸由下焦氣實相火旺盛舉胎而上上逼心胸也

成方切用胎 卷下 紫蘇飲 七

蘇葉

錢一

當歸

分七

芍藥

芍藥

人參

陳皮

大腹皮

分五

甘草

分二

加薑煎空心服心腹痛甚

者加木香延胡索

芎歸芍藥以和其血蘇橘大腹以順其氣氣順

血和則胎安矣既利其氣復以參甘養其氣者

順則順其邪逆之氣養則養其冲和之氣也

天仙藤散

陳景初

治子氣

婦人衝任素受血風因妊娠而足腫喘悶妨食

甚則腳指出黃水病名子氣非水也

天仙藤

即青木香藤微炒

香附

炒

烏藥

陳皮

甘草

炙等分加紫蘇三葉木瓜生薑各三片空心煎服或爲末鹽湯調下日三  
天仙藤之苦溫疏氣活血能解血中之風氣香附烏藥陳皮之辛溫以行鬱氣紫蘇生薑之辛溫以疏表氣甘草之甘緩以和正氣少加木瓜以除溼熱利筋骨調營衛也

白木散

生全

治子腫面目肢體虛肘如水狀

胎中挾溼

水與血搏溼氣流溢面目肢體浮腫亦名胎水原因煩渴引飲過多或泄瀉損傷脾胃脾虛不能制水五六箇月多有之

白木

錢一

薑皮

陳皮

茯苓皮

大腹皮

分五

爲末米飲下指迷方有桑白皮無白木

此卽五皮飲

丹溪除薑皮腹皮加川芎木通

水病當令上下分消薑皮橘皮辛而能散使水

從毛竅出腹皮苓皮淡而能泄使水從溺竅出

水盛由于土衰故用白木之甘溫以扶脾土而

隄防之不致汎溢也

鯉魚湯

千金

治妊娠腹大胎間有水氣

白木

兩五

茯苓

兩四

當歸

白芍

兩三

右細剉片以

鯉魚一尾修事如食法煮取汁去魚不用每服  
四錢入魚汁一盞半生薑七片橘皮少許煎至  
七分去滓空心服或服鯉魚  
粥亦可

按此方用歸芍以養血苓朮以實脾薑橘以和  
胃止用鯉魚汁以利水絕不雜用利水之藥走  
氣傷陰暗損胎元且制小其服以緩治之深爲  
有見

竹葉湯

治妊娠心驚膽怯終日煩悶名子煩受胎

四五箇月相火用事或盛夏君火大行俱能乘  
肺以致煩躁胎動不安亦有停痰積飲滯於胸

方  
卷  
二

膈致令  
煩躁者

麥冬錢半 茯苓 黃芩錢一 人參分五 淡竹葉片十 如

有痰者加竹瀝少許

竹葉清煩黃芩消熱麥冬涼肺心火乘肺故 茯苓

苓寧心人參補虛妊娠心煩固多虛也

紫苑湯方良 治子嗽

紫苑 天冬錢一 桔梗分五 甘草炙 桑白皮 杏仁

分三 竹筍分二 入蜜溫服

子嗽由於火邪當以清火潤肺為務桔梗桑皮

之涼以瀉之天冬竹筴之寒以清之紫苑炙草  
之溫杏仁白蜜之澤以潤之也

# 安榮散

本

治子淋心煩悶亂

子淋勝胱小腸虛熱也虛則不能制

水熱則不得通利故淋心與小腸相表裏故煩悶亦有因房勞內傷胞門衝任虛者宜入珍湯或腎氣九等方

人參

細辛兩當歸

甘草

燈草

五錢

木通

滑石

麥冬

三錢

為末每二錢麥冬湯調下

陳來章曰虛熱宜補故用人參甘草之甘淋悶  
宜通故用木通燈草之滲滑石之滑肺燥則天

氣不降而麥冬能清之。腎燥則地氣不升而細辛能潤之。經曰地氣上為雲天氣下為雨。而後便能通也。血燥則溝瀆不濡而當歸能滋之也。

胎元飲 治婦人衝任失守胎元不安不固者隨

證加減用之。或間日或二三日常服一二劑。脾

兩虧而胎不固者此方最宜。蓋胎元不固皆因脾虛而因腎虛者為尤多。

人參隨宜當歸 杜仲 芍藥錢二熟地錢二白朮

錢半炙甘草錢一陳皮七分無滯 如下元不固而

多遺濁者加山藥五味子補骨脂之屬 氣分

虛甚者倍白朮加黃耆。但耆朮氣浮能滯胃口。  
倘胸膈有飽悶不快者須慎用之。倘虛而多  
寒兼嘔者加炮薑七八分或一二錢。或虛而  
兼熱者加黃芩一錢五分或加生地二錢去杜  
仲。陰虛小腹作痛加枸杞子二錢。多怒氣  
逆者加香附無妨。或砂仁亦妙。有所觸而動  
血者加川斷阿膠各一二錢。嘔吐不止加霞  
天麴二錢煨薑二三片。

固胎煎 治肝脾多火多滯而屢墮胎者

黃芩

錢二

白朮

錢一

當歸

錢一

砂仁

錢五

陳皮

錢一

芍

藥

錢一

五分

涼胎飲

治胎氣內熱不安等證

生地

芍藥

錢二

黃芩

當歸

錢一

枳殼

石斛

一錢

茯苓

錢一

甘草

七分

生用

如熱甚者

加黃蘗一

錢

二錢

參朮飲

丹

治妊娠轉胞

轉胞者

胎逼及胞

壓在

一邊胞系

轉戾臍下

急

痛。洩數或閉也。因氣血虛弱。痰飲壅滯以致之。

當歸

熟地黃

芍藥

人參

白朮

陳皮白半夏

甘草炙

加薑煎空心服此

入珍湯去茯苓加陳皮半夏以除痰也

氣虛補以四君血虛補以四物痰飲消以二陳

使氣得升舉而胞自通也

丹溪曰轉胞之病婦人稟受弱者憂悶多

者性躁急者食厚味者多有之古方用滑利藥

鮮效因思胞不自轉為胎所壓胎若舉起胞系

自疏水道自通矣近吳宅寵人患此脈似瀉重

則飲予曰此得之憂患瀉為血少氣虛弦為有

隨則胎知所避而不能舉氣虛有飲中焦不清而

探喉中吐出藥汁候氣定又與之入貼而安此

恐偶中後治數人皆効仲景云婦人本肥盛

今反羸瘦胞系了戾但利小便則愈宜服腎

氣丸以中有茯苓故也地黃為君功在補胞

又法將孕婦倒豎胎轉而小便自通矣

表實六合湯

海藏

治妊娠傷寒頭痛身熱無汗脈

緊太陽經病

四物湯

每味一兩

麻黃

細辛

五錢

凡婦人傷寒六經治例皆同有懷妊者則以安胎爲主藥中有犯胎者則不可用也海藏皆以四物爲君養血安胎餘同傷寒例分證而治麻黃細辛發汗解表故加用之治表實無汗者四物四兩加桂枝地骨皮各七錢名表虛六合

湯治妊娠傷寒表虛自汗

地骨皮涼血故身熱能退熱止汗

身熱

惡寒頭痛項強脈浮而弱四物四兩加防風蒼  
朮各七錢名風溼六合湯治妊娠傷寒中風溼  
氣肢節煩痛頭痛身熱脈浮四物四兩加升麻  
連翹各七錢名升麻六合湯治妊娠傷寒下後  
過經不愈溼毒發斑如錦紋者四物四兩加柴  
胡黃芩各七錢名柴胡六合湯治妊娠傷寒胸  
脇滿痛而脈弦少陽經證四物四兩加大黃五  
錢桃仁十枚炒名大黃六合湯治妊娠傷寒大

便閉小便赤氣滿而脈沉數太陽陽明本病也

急下之

大黃桃仁。妊娠所忌。然傷寒間有用之者。謂有病病當之也。經曰。婦人重身。毒

之何如。岐伯曰。有故無殞。亦無殞也。此之謂與。四物四兩。加人參五味

各五錢。名人參六合湯。治妊娠傷寒。汗下後咳

嗽不止。四物四兩。加厚朴枳實炒各五錢。名朴

實六合湯。治妊娠傷寒。虛痞脹滿。陽明本虛者

本胃府也。四物四兩。加梔子黃芩各五錢。名梔子六

合湯。治妊娠傷寒。汗下後不得眠。四物四兩。加

石膏知母各五錢。名石膏六合湯。治妊娠傷寒。

大渴而煩脈長而大四物四兩加茯苓澤瀉各

五錢名茯苓六合湯治妊娠傷寒小便不利太

陽本病本勝脫府也四物四兩加阿膠艾葉各五錢

名膠艾四物湯一方加甘草一方加甘草黃耆乾薑治妊娠傷寒

汗下後血漏不止損動胎氣者四物四兩加附

子肉桂各五錢名附子六合湯治妊娠傷寒四

肢拘急身涼微汗腹中痛脈沉遲者少陰病也

桂附雖辛熱動胎之藥然寒證用之適所以安胎四物四兩加生地酒浸

大黃各五錢名四物大黃湯治妊娠傷寒畜血

證歌曰婦人妊娠若畜血。抵當桃仁莫妄。  
證施要教母子俱無損。大黃四物對分之。

當歸散

金匱

妊娠有宜常服者。

婦人血少。有熱胎動不安。及數牛產

難產者。並宜服之。胎無疾苦。臨盆易產。產後百病悉皆主之。

當歸

芍藥

芍藥

黃芩

一

白朮

半

為末

酒調服日二。

衝任血盛則能養胎而胎安。歸芍藥能養血而益衝任。又懷妊宜清熱涼血。血不妄行則胎安。黃芩養陰退陽。能除胃熱。白朮補脾燥溼。亦除胃熱。胎氣係於脾。脾虛則脾胃健則能運化。

精微取汁為血以養胎。自無惡阻嘔逆之患矣。

易簡方加山茱萸治經三四月不行或一月再

至數月不行者血少也。滋之以芩歸芍藥補之。

能補脾黃芩能涼血。山茱萸能固經。

達生散

亦名束胎散。丹溪

妊娠八九月服數十劑易生

有力

詩曰誕彌厥月先生如達達小羊也。其生甚易產難多因氣血虛弱。替衛滯澀服此

則易生如達矣。

當歸

酒洗

芍藥

酒炒

人參

白朮

土炒

紫蘇

錢一

甘草

炙

錢大腹

陳皮

錢一

葱五葉

黃楊腦子

七箇煎

黃楊木主產難

或加枳殼砂仁或春加川芎夏加黃芩

冬如本方或有別證以意消息

當歸芍藥以益其血人參白朮以益其氣腹皮

陳皮紫蘇葱葉以疏其壅氣血不虛不滯則臨

產自無畱難之患矣

丹溪曰產難往往見於鬱悶安逸之人富貴奉養之

家若貧賤者鮮有之古方有瘦胎飲為湖陽公

主而作恐非至到之言予族妹苦於難產遇胎

則觸而去之予甚憫焉視其形肥而勤於女工

知其氣血久坐不運兒因母氣虛亦不能自運

爾當補母氣則兒健易產令其有孕五六月以

大全良方紫蘇飲加補氣藥與之數十貼得男

甚快因以其方隨母之性稟與時令加減服無

不應因名曰達生散云昔湖陽公主難產方

士進瘦胎飲。用枳殼四兩。甘草二兩。炙。五月後  
日服一錢。潔古改以枳木。名束胎丸。寇宗奭明  
其不然。蓋孕婦全賴血氣以養胎。血氣充實。胎  
乃易生。彼公主奉養太過。氣實有餘。故可服之。  
若一槩濫施。誤之甚矣。按瘦胎飲。又名枳殼散。  
治胎肥難產。臨月服之。張氏加香附。行氣寬膈。  
薑湯下。凡臨產坐草。產母用力。須待兒子順  
身。臨逼門戶。穀道挺進。漿破血下。方可用力。一  
送令兒下生。若用力太早。并妄服催生藥。多致  
不救。生不必催也。催之則摘方苞之蔓。振宋  
人之苗。爾非唯無益。而又害之矣。古方有用兔  
腦者。有用豬脂者。有用油蜜葱白者。有用葵子  
者。有用牛乳。榆皮。滑石者。有用金鳳子者。有用  
柞枝者。有用萬年青子者。大都取其滑澤之義。  
雖近理而莫必其效也。又有用弩牙灰者。有用  
蛇退灰者。有用筆頭灰者。有用百草霜者。有用  
伏龍肝者。有用螯頭灰者。有用蓖麻子。貼于足  
心者。有手握石。燕者。雖曰各有深意。但燒灰而

服者徒劫燥其津液。手握足貼者勿驗爾。噫。平時失於將理。至于臨產艱難頻以雜藥催之。皆或也。又固生丹方書中大誇其催生之効。并產後種種功能。然不過破瘀之効爾。今世執面用之者。爲害甚多。所以不錄。

殿胞煎一治產後兒枕疼痛等證如神

當歸

五錢或一兩

川芎

炙甘草

茯苓

一錢

肉桂

二錢

三錢或五七分

水煎熱服

如脈細而寒或嘔者加

炒黃乾薑

一二錢

如脈弱陰虛者加熟地三

五錢

如氣滯者加香附一二錢或烏藥亦可

腰痛加杜仲二三錢

如血熱多火者去肉

桂加酒炒芍藥一二錢張景岳曰丹溪云芍藥

後忌用之此亦言之過也夫芍藥之寒不過于生血藥中稍覺其清爾非若苓連輩之大苦大寒者也使芍藥猶忌則他之更寒者尤為不可用矣余每見產家過慎者或因太煖或因年力方壯而飲食藥餌大補過度以致產後動火者病熱極多若盡以產後為虛必須皆補豈盡然哉且芍藥性清味酸而收最宜于陰氣散失之證豈不為產後之要藥乎不可不辨也

豬蹄湯靈苑 治乳少

豬蹄一隻 通草兩

豬蹄鹹能潤下通草淡能通竅

當歸補血湯加葱白方 治產後無乳乳者血氣之所成也

本草方用 卷下 補血湯 治產後無乳 七

故氣血充盛之婦未嘗無乳。凡見無乳者皆氣體怯弱之婦也。古方中用穿山甲王不留行及漏蘆等物唯氣血有餘而兼壅滯者宜之。虛弱者當禁之矣。

當歸錢二黃耆兩一葱白十枚

當歸黃耆大補其氣血此養乳汁之源也葱白辛溫直走陽明以達于乳房故用之為使此通乳汁之渠也

參朮膏

丹溪

治產後胞損成淋瀝證或遺尿

人參

二錢五分

白朮

二錢

黃耆

半錢

茯苓

陳皮

桃仁

錢一炙甘草五分

用豬羊胞煮湯入藥煎服

產後胞損必令氣血驟長其胞可完若稍遲緩  
恐難成功故以參耆朮草以補之加陳皮以宣  
其滯桃仁以活其血茯苓以助其下行用豬羊  
胞煮湯入藥煎服取其以胞補胞之義不特引  
經也徐氏婦壯年患此因思肌肉破傷在外者  
且可補完胞雖在內自亦可治胎其脈虛甚因  
悟曰難產之人多是氣虛難產之後氣血尤虛  
因用峻補以參朮膏煎以豬羊胞  
極饑時與之每劑一兩一月而步

黑神散

方局

治產後惡露不盡攻衝作痛及胞衣

不下胎死腹中

由血滯不行也

或方勿用

產

卷下

參耆朮

黑神散

七

熟地黃 歸尾 赤芍 蒲黃 桂心 乾薑

炒甘草兩四黑豆半炒去皮每服二錢酒童便各

半煎便產須知有生地黃

前證皆因血瘀不行熟地歸芍之潤以濡血蒲

黃黑豆之滑以行血桂心乾薑之熱以破血乾薑

辛熱能去惡生新故用甘草者緩其正氣用童

便者散其瘀逆加酒者引入血分以助藥力也

產後惡露不行坐蓐勞傷者以前四味從輕治之若挾宿冷氣滯血凝胞胎不下則宜全用快行之也。寒多及秋冬宜之。若性急形瘦有火之人及夏月均宜審用。

去蒲黃黑豆加茯苓錢半吳茱五分當歸全熟用

地各三錢芍藥

白者酒炒焦錢半

炙甘草炒乾薑肉桂

北細辛各一錢水煎名九蜜煎治產後陽氣虛寒或陰邪入臟心腹疼痛嘔吐不食四肢厥冷古黑神散百草霜白芷等分每二錢煎入童便醋少許和服治橫生逆產及胎前產後虛損崩漏等證

清化飲

治產後因火發熱及血熱妄行陰虧諸

火不清等證

白芍 麥冬錢二 丹皮 茯苓 生地 石斛三

錢一 黃芩錢一 骨蒸多汗者加地骨皮一錢半

熱甚而渴或頭痛者加石膏一二三錢 內熱

便瀉者加木通一二錢或黃檗梔子皆可隨證

用之 如兼外邪發熱加柴胡一二錢

失笑散方局

治惡露不行心包絡痛或死血腹痛

惡血阻而不行上衝于包絡下阻于腹中皆悶而作痛

蒲黃 五靈脂 等分爲末煎膏醋調服

生蒲黃性滑而行血五靈脂氣燥而散血氣脈入

皆能入厥陰而活血止痛故治血痛如神。

本方各一兩加木通赤芍各五錢每四錢入鹽少許服名通靈散治九種心痛。

清魂散

嚴氏

治產後惡露已盡忽昏運不知人後產

氣血虛弱又感風寒也

澤蘭葉

炙甘草

人參

川芎

五錢一分

荆芥

爲末溫酒調下更宜燒漆器淬醋炭于牀前使

聞其氣

氣血虛弱故以人參甘草補其氣外感風邪故

以荆芥疏其風荆芥最散血中澤蘭川芎以去其未下之瘀血風邪去餘血下氣血生則神清矣肝藏魂故曰清魂

當歸羊肉湯 治產後發熱自汗肢體疼痛名曰

葶勞

黃耆兩人參

當歸錢七生薑錢五

用羊肉一觔

煮汁去肉入前藥煎服如惡露未盡加桂行血

有寒加吳茱萸有熱加生地汁有氣加細辛

參耆補氣而固衛當歸養血而調營生薑辛溫

引氣藥入氣分而生新血羊肉甘熱用氣血之

屬以補虛勞熱退而汗收矣吳綬曰產後不可

時傷力發熱有去血過多發熱有惡露不盡發

熱有三日乳蒸發熱或早起勞動飲食停滯亦

皆發熱狀類傷寒要須詳辨大抵產後大血空

虛若汗之則變筋惕肉瞤或昏迷不醒或搐搦

不定或大便閉濇其害匪輕凡有發熱且與四

物湯芎歸為君白芍須炒過酒蒸熟地黃佐之

加軟苗柴胡乾薑人參主之蓋乾薑辛熱能引

血藥入血分氣藥入氣分且能去惡生新有陽

生陰長之道以熱治熱深合內經之旨如惡露

不盡者益母丸黑神丸必兼用之胃虛食少加

白朮茯苓嘔逆者加陳皮半夏其餘六經治例

皆同必以四物湯為主乃養血務本之要也劉

河間曰大抵產病天行從增損柴胡

雜證從增損四物宜詳脈證而治之

除人參黃耆用羊肉一觔生薑五兩當歸二兩名當歸

生薑羊肉湯金匱治產後腹中疴痛及寒疝腹痛

虛勞不足

返魂丹即益母草膏丸產寶

治胎前產後一切諸病及月

經不調赤白帶下

五月五日六月六日或小暑日益母草花正開時連根採收陰乾用花葉及子石臼搗末蜜丸或搗汁于砂鍋內文武火熬成膏服忌鐵如胎動腹痛下血不止當歸湯下橫生逆產胎衣不

下炒鹽湯下。產後血暈。口渴。狂言。產後中風。失音。口噤。及血結奔痛。時發寒熱。面赤。心煩。或鼻衄。舌黑。口乾。並童便和酒下。產後喘嗽。惡心。吐酸。脇痛。無力。酒下。產後瀉血。棗湯下。產後痢疾。米湯下。產後崩漏。糯米湯下。產後帶下。膠艾湯下。產後二便不通。煩躁。口苦。薄荷湯下。凡產後以童便化服一丸。能調經絡。破血痛。益母草功擅消水行血。去瘀生新。利大小便。故爲經產所需。然其性辛散寒滑。唯血滯血熱者。

宜之稍挾虛寒者服之爲害不淺今人以其有  
益母之名而濫用之誤矣觀其能消疔腫散乳  
癰可知其性之全無補益矣時珍曰益母草根  
若治血分風熱明目調經用子爲良若胎產瘡  
腫消水行血則可並用蓋根莖花實頗于行子  
則行中有補也

免懷湯

欲摘乳者此方主之

婦人之血上則爲乳下則爲經欲摘

乳者通其月事則乳汁  
下行免乳脹之苦矣

當歸尾

赤芍藥

酒紅花

酒牛膝

各五錢

四味皆下行導血之品故以用之名曰免懷者

子生三年然後免于父母之懷也